BULLETIN TECHNIQUE DE LA

STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

LANGUEDOC_ROUSSILLON

MONTPELLIER - 16, Rue de la République : TEL : M2 58-72

2ème année

Nº 10

27 Avril 1954

AVERTISSEMENT

TAVELURE DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS

Zones V - VI

Les pommiers et poiriers se sont généralement beaucoup développés depuis le dernier traitement; d'autre part les précipitations atmosphériques, suivies d'un relèvement de température, nécessitent une nouvelle protection des organes verts. Ce traitement est à terminer le lo mai.

INFORMATIONS

Toutes zones

LUTTE CONTRE LES COURTILIERES

Pour assurer la destruction des courtilières, on emploiera des appâts à basé de son de blé avec le lindane (0,2% de matière active) ou le chlordane (0,5 à 0,7 % de matière active).

Le son ainsi préparé sera répandu légèrement mouillé, le soir, à la volée, dans les parcelles à protéger.

L'emploi du phosphure de zinc est interdit pour la destruction des courtilières,

LUTTE CONTRE LES PUCERONS

Les colonies de pucerons se développent sur toutes les espèces fruitières, en particulier sur pêchers.

Il convient d'effectuer les traitements dès le début des attaques et avant que la végétation ne soit trop abondante.

Les traitements effectués dès maintenant sont les plus efficaces et les plus économiques.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux, P.BERVILLE

Le Contrôleur chargé des Avertissements Agricoles, L.L.TROUILLON

Imprimé à la Station d'Avertissements Agricoles du Languedoc-Roussillon 6 rue de la République, Montpellier Le Gérant: R. BERTRAND Autor du 23/I/53 Reproduction adaptation réservées

Ministère de l'Agriculture

Ecole Nationale d'Agriculture de MONTPELLIER

STATION REGIONALE d'AVERTISSEMENTS VILLES Montpellier, le 27 Avril 1954

MILDIOU.

NOTE No 4.

Les pluies du 25 au 26 avril, assez importantes entre Montpellier, Lunel, Aigues-Mortes, Arles-Davignon, ont provoqué une nouvelle germination des oeufs d'hiver du mildiou, dont l'évolution a été constatée le 26 au matin à l'Ecole d'Agriculture de Montpellier.

En raison du calme des précipitations, les contaminations produites seront probablement peu nombreuses; seules les jeunes feuilles en contact avec le sol mouillé risquent d'être atteintes.

Il pourrait ne pas en être de même partout où des averses violentes ont, dans la soirée du 26 et jusqu'au matin du 27, fait rejaillir l'eau des flaques sur les organes verts du pied des souches.

Dans les deux cas la suppression, effectuée dès que possible, de la végétation située près de terre, sera très utile.

Le mildiou découvert à Bessan et que nous avons déjà signalé a été enlevé, et la vigne qui le portait, largement sulfatée; d'autres taches ont été trouvées le 16 à Villeveyrac. Notre correspondant d'Agde vient d'en recueillir le 24 avril au lieu dit "La Conté" et celui d'Aigues-Mortes en signale le 27 dans les sables.

Il n'y a pas à exclure l'éventualité de repiquages provoqués par les pluies du 25 et du 26 à partir d'autres foyers primaires non reconnus et qui ont pu s'établir dans les parcelles les plus humides où la végétation était assez avancée.

Dans ces situations on ne saurait trop recommander la suppression des rejets du greffon et l'exécution d'un premier sulfatage.

Le Directeur de la Station Régionale d'Avertissements Viticoles,

G. BERNON